

Gluxo Cobre

Solución Concentrada

CONT. NETO 1 LITRO

Registro Sanitario: En trámite

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

INGREDIENTE ACTIVO	PROPORCIÓN
Gluconato de cobre	49.9%
(Equivalente a 84.5 g de cobre metálico/L)	
INGREDIENTES INERTES	
Disolventes	50.1%
TOTAL	100%

MODO DE ACCIÓN

GLUXO COBRE actúa por contacto de manera preventiva sobre hojas, tallos y frutos. Posee un efecto traslaminar que penetra el tejido vegetal, permitiendo que los iones de cobre se alojen en el interior de las hojas 5 horas después de su aplicación. Asimismo, ejerce una acción multisitio al atacar diferentes lugares de la célula de hongos y bacterias, deteniendo su desarrollo e impidiendo el daño a la planta.

BENEFICIOS COMPROBADOS

- **Alta asimilación:** Su formulación con ácido glucónico crea un complejo orgánico que facilita la rápida absorción del producto.
- **Resistente al lavado:** Su acción quelante minimiza las pérdidas por lluvia o humedad.
- Amplio espectro de protección con menor riesgo de generar poblaciones resistentes en los patógenos.
- **Seguro para su cultivo:** No causa fitotoxicidad, no acartona y no mancha si se utiliza en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD Y RECOMENDACIONES DE USO

Mezclar únicamente con productos registrados en los cultivos autorizados. Realizar una prueba a pequeña escala si se desconoce la compatibilidad de la mezcla. Para un desempeño óptimo, asegúrese de que el pH del agua de aplicación esté entre 6.0 y 6.5.

DOSIS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

Preparación: Agite el envase. Haga una premezcla en una cubeta con agua hasta la mitad, añada el producto, agite vigorosamente y vierta en el tanque.

Hortalizas, Berries y Agave: 0.5 a 1.5 L/ha en un volumen de 200 a 600 L de agua/ha, con intervalos de 7 días.

Frutales (Aguacate, Cítricos, Mango, Papaya): 50 a 100 mL por cada 100 L de agua (o 1 mL por litro). Asperjar hasta el punto de goteo. Repetir cada 7 a 28 días según la presión de la enfermedad.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	RECOMENDACIONES
Aguacatero (SL)	Roña del aguacate (<i>Sphaceloma perseae</i>)	50 - 75 mL en 100 L de agua	Iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad o bien cuando la fruta se encuentre en su desarrollo incipiente y se detecten infestaciones de triphs. Realizar 2 aplicaciones en un intervalo de 15 a 28 días entre cada una dependiendo del desarrollo de la plaga y la presión de la enfermedad. Utilizar un volumen de agua necesario para cubrir todos los frutos y ramas.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	50 - 100 mL en 100 L de agua	Realizar 2 aplicación al follaje; de ser el caso tres aplicaciones adicionales a intervalo de 15 días, indicando las aplicaciones al detectar los primeros síntomas de la enfermedad en flores y frutos. Aplicar en el volumen que utilice para asperjar una ha.
Agave (SL)	Pudrición del cogollo (<i>Erwinia carotovora</i> Marchitez <i>Fusarium oxysporum</i>)	0.5 - 1.0	Se recomienda aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad, dirigir las aplicaciones al cogollo de la planta. Se recomienda aplicar cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad. Dirigir las aplicaciones a la base de la planta.
Banano (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0.5 - 0.75	Aplicar 30 días antes de la cosecha dirigido a racimos y frutos.
Brócoli, Coliflor Col, Repollo Col de Bruselas (SL)	Vena negra / Mancha foliar (<i>Xanthomonas campestris</i> pv.) Mildiu vellosa (<i>Peronospora parasitica</i>) Mancha negra (<i>Alternaria brassicae</i>)	1.0 - 1.5	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días empleando un volumen de agua de 400 L/ha
Papa, Jitomate Chile (picante) Pimiento Morron Berenjena Tomate de cascara (SL)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>) Mancha bacteriana (<i>Xanthomonas campestris</i>) Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	0.75 - 1.0	Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad o bien cuando se presenten los primeros síntomas de la misma. Realizar 4 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días entre cada una. Utilizar un volumen de 200 - 600 L/ha, necesario para un buen cubrimiento, dependiendo del desarrollo de la planta y el área foliar de la misma.
Calabacita Melón Sandía Pepino (SL)	Cenicilla polvorienta (<i>Erysiphe cichoracearum</i>) Mancha angular (<i>Pseudomonas syringae</i>)	0.5 - 1.0	
Ornamentales (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> spp.) Cenicilla (<i>Oidium</i> spp.) Moho gris (<i>Botrytis</i> spp.)	0.5 - 1.0 ó 50 - 75 ml en 100 L	Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo de la enfermedad o bien cuando se presenten los primeros síntomas de esta. Realizar 4 aplicaciones foliares con un intervalo de 7 días entre cada una.
Zarzamora Fresa, Frambuesa Arándano, Vid (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Mancha angular (<i>Xanthomonas fragariae</i>)	0.75 - 1.0	Iniciar las aplicaciones de forma preventiva, cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la enfermedad realizar un mínimo de dos aplicaciones semanales.
Ajo, Cebolla Cebollín (SL)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75 - 1.0	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días entre cada una, iniciando cuando se detecte la enfermedad en el cultivo, volumen de agua recomendado de 200 a 400 L/ha.
Limón, Lima Naranja, Toronjo Mandarino Tanjerina Pomelo (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>) Sarna de los cítricos (<i>Elsinoe fawcettii</i>)	75 - 100 ml en 100 L de agua	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días entre cada una, iniciando cuando se detecte la infección en el cultivo. Dirigir la aplicación a la floración y/o frutos, usar la suficiente cantidad de agua por árbol. Asperjar hasta el punto de goteo.
Mango, Papaya (SL)	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	1 ml por litro de agua	Dirigir la aplicación a la floración y/o frutos, usar la suficiente cantidad de agua por árbol. Asperjar hasta el punto de goteo.

BACTERICIDA Y FUNGICIDA